

Erkrankung	Krankheitszeichen (u.a.)	Kita-Besuch?	wann zum Kinderarzt? (u.a.)	Hygienetipps	ärztliches Attest
<b>grippaler Infekt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Husten</li> <li>Schnupfen</li> <li>Kopfschmerzen</li> <li>ggf. erhöhte Temperatur</li> </ul>	<b>ja bei:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Temp. &lt; 37,5°C (ohne Medikamente)</li> <li>allgemeinem Wohlbefinden</li> </ul> <b>nein bei:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Temp &gt; 37,5°C</li> <li>Krankheitsgefühl</li> <li>Husten mit starkem Auswurf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>anhaltendes Fieber &gt; 39°C</li> <li>starkes Krankheitsgefühl</li> <li>Trinkverweigerung</li> <li>starke Schmerzen</li> <li>Nackensteifigkeit</li> <li>grün/gelblichem Auswurf</li> <li>blutiges Husten</li> <li>starke Ohrenscherzen</li> <li>Wesensveränderung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>regelmäßiges Händewaschen</li> <li>eigenes Handtuch nutzen</li> <li>Taschentuch nur 1x benutzen</li> <li>verschwitzte Kleidung wechseln</li> <li>Hand vor den Mund beim Husten</li> <li>in die Ellenbeuge niesen</li> </ul>	nein
<b>Magen-Darm-Infekt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erbrechen</li> <li>Durchfall (mehr als 3 ungeformte Stühle in 24 Stunden)</li> <li>ggf. erhöhte Temperatur</li> <li>ggf. Bauchschmerzen</li> <li>ggf. Trink- / Eßverweigerung</li> </ul>	<b>ja bei:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>kein Durchfall / Erbrechen in den letzten 48 Stunden</li> <li>Temp. &lt; 37,5°C (ohne Medikamente)</li> <li>allgemeinem Wohlbefinden</li> </ul> <b>nein bei:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>akuten Beschwerden</li> <li>Temp &gt; 37,5°C</li> <li>Krankheitsgefühl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>anhaltendes Fieber &gt; 39°C</li> <li>starkes Krankheitsgefühl</li> <li>Trinkverweigerung</li> <li>starke Schmerzen</li> <li>blutiger Stuhl</li> <li>Wesensveränderung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>regelmäßiges Händewaschen</li> <li>eigenes Handtuch nutzen</li> <li>ggf. Händedesinfektion</li> <li>regelmäßige Reinigung der Toilette (ggf. inkl. Desinfektion)</li> <li>verschwitzte Kleidung wechseln</li> <li>keine Durchfallstopper (z.B. Immodium®) benutzen</li> </ul>	nein
<b>Kopfläuse, Krätze &amp; Co.</b>	Fallen meist durch Juckreiz, Brennen, Pusteln oder Entdecken der „Tierchen“ auf. Läuse können Sie selbst mit einem Mittel aus der Apotheke behandeln. Bei einem ersten Befall mit Läusen ist ein ärztliches Attest nicht zwingend erforderlich, im Wiederholungsfall häufig doch. Bei Verdacht auf Krätze (Scabies) sollten Sie den Kinderarzt oder einen Hautarzt aufsuchen. Ein ärztliches Attest zur Wiedenzulassung ist zwingend erforderlich.				
<b>Hautausschlag</b>	Jeder neu aufgetretene und anhaltende Hautausschlag sollte vom Kinderarzt abgeklärt werden. Dies ist vor allem erforderlich, wenn zusätzliche Krankheitszeichen wie Fieber, Abgeschlagenheit und/oder Wesensveränderung bestehen.				
<b>„Kinderkrankheiten“ (u.a. Masern, Mumps, Röteln, Windpocken ...)</b>	Immer, wenn Verdacht auf eine ansteckende Kinderkrankheit besteht sollte zeitnah der Kinderarzt oder der ärztliche Notdienst aufgesucht werden. Diese Krankheiten sind im Allgemeinen ansteckend und können für Ihr Kind gefährlich verlaufen. Wann Ihr Kind wieder in die KiTa darf entscheidet der Arzt in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt. Bitte denken Sie daran, Ihr Kind impfen zu lassen und überprüfen auch Sie <b>regelmäßig</b> , ob Ihr Impfschutz noch ausreichend ist.				

Wenn bei Ihrem Kind ein bestimmter Krankheitserreger (z.B. Norovirus, Hepatitisvirus, Salmonellen ...) nachgewiesen wurde hat dies ggf. Einfluss auf die o.g. Informationen. In diesen Fällen berät Sie das Gesundheitsamt gerne zur Frage der Wiedenzulassung (☎ 02251 - 15-0).

Weitere interessante Informationen finden Sie hier: [www.kindergesundheit-info.de](http://www.kindergesundheit-info.de) [www.infektionsschutz.de](http://www.infektionsschutz.de) [www.impfen-info.de](http://www.impfen-info.de)